

COMPENSORIO ALPINO
VALLE BREMBANA

CAPRIOLO

RISULTATI OPERAZIONI DI CENSIMENTO

E

PROPOSTA PIANO DI PRELIEVO

STAGIONE VENATORIA 2021-2022

CAPRIOLO

RISULTATI OPERAZIONI DI CENSIMENTO E PROPOSTA PIANO DI PRELIEVO STAGIONE VENATORIA 2021-2022

A cura di



La presente relazione, che si compone di 25 pagine complessive, è stata redatta in base al Protocollo tecnico tra la Provincia di Bergamo e l'I.S.P.R.A. per la gestione degli ungulati selvatici poligastrici, così come definito nella determina nr 949 del 06 maggio 2015.

IL PRESIDENTE

Alessandro Balestra

IL TECNICO

Dott. Roberto Viganò

SOMMARIO

INQUADRAMENTO TERRITORIALE	4
CENSIMENTI	5
Settore 1	6
Settore 2	7
Settore 3	8
Settore 4	9
Settore 5	10
Consuntivo Comprensorio Valle Brembana	11
ESITO DEL PIANO DI PRELIEVO 2020/2021	14
Settore 1	15
Settore 2	16
Settore 3	17
Settore 4	18
Settore 5	19
PIANO DI PRELIEVO PER LA STAGIONE 2021/2022	20
Settore 1	21
Settore 2	22
Settore 3	23
Settore 4	24
Settore 5	25

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comprensorio Alpino Valle Brembana è disegnato dal bacino idrografico del Fiume Brembo che all'altezza di Lenna si suddivide in due rami, ad ognuno dei quali corrisponde una valle principale, che a sua volta si ripartisce in numerose convalle tributarie.

La parte meridionale del CA comprende anche il bacino del torrente Enna (Val Taleggio e il bacino della Val Parina, tributari del solco principale della Val Brembana.

I limiti settentrionali ed occidentali del CA corrono invece sulle linee spartiacque con il bacino primario dell'Adda corrispondenti con i confini amministrativi delle province di Sondrio e Lecco.

Dal punto di vista vegetazionale il CA rientra completamente nella zona cosiddetta alpina. Procedendo per strati altimetrici sono presenti a seconda degli orizzonti:

- Vegetazione erbaceo-arbustiva dell'ambiente nivale;
- Vegetazione degli ambienti alpini, caratterizzata da rododendro-vaccinieti;
- Vegetazione degli ambienti sub-alpini con consistenti popolamenti di aghifoglie;
- Vegetazione degli ambienti montani con formazioni forestali a predominanza di latifoglie;
- Vegetazione degli ambienti sub-montani rappresentata dal trinomio roverella, carpino nero e orniello.

In tutti gli orizzonti è marcata la presenza di aree aperte coltivate a prato-pascolo, in forte regresso per via della riforestazione naturale incipiente soprattutto alle quote più basse.

Il Comprensorio Alpino Valle Brembana ha un Superficie totale pari a 51.661,11 ha ed un territorio territorio agro-silvo-pastorale pari a 50.480,40 ha.

All'interno del territorio di competenza del CA Valle Brembana sono stati individuati 5 distretti di gestione per gli ungulati. In base alle indicazioni contenute nel "Protocollo tecnico per la gestione degli ungulati selvatici poligastrici in Provincia di Bergamo" la SUS è stata così calcolata:

SUS = Sup. Boschi + Sup. prati e pascoli + Sup. coltivati + 0,25 Sup. improduttiva

SETTORI	1	2	3	4	5
Superficie Totale					
SUS	8.273,78	9.349,28	7.497,28	4.654,14	10.952,77

Tabella 1: TASP, SUS e categorie ambientali dei settori di gestione per la specie capriolo.

CENSIMENTI

I censimenti al capriolo nel Comprensorio Alpino Valle Brembana vengono svolti sulla base del "Protocollo tecnico per la gestione degli ungulati selvatici poligastrici in Provincia di Bergamo" da punti fissi di osservazione sul primo verde.

Considerando la situazione emergenziale legata all'epidemia di Covid-19, i censimenti nell'anno 2021 non sono stati resi obbligatori per i cacciatori e sono stati svolti solo da alcuni volontari che hanno in ogni caso coperto le aree di censimento previste, seppur in date differenti. Inoltre, la persistenza al suolo della neve anche in primavera inoltrata ha comportato che le uscite si svolgessero sia nel mese di aprile che nella prima metà di maggio.

Considerando il cambio d'uso del territorio e la sempre maggior frequentazione dei caprioli degli areali periurbani, tale metodica tende a sottostimare in maniera importante la popolazione presente nel Comprensorio.

Per la prossima stagione ci si pone l'obiettivo di riparametrare le aree di censimento svolgendo le attività di conta nella medesima giornata soprattutto per quelle aree che vedono importanti migrazioni degli animali.

Settore	SUS Complessiva	SUS Censita	% area di conta
1	8.273,78	4.844,34	58,6%
2	9.349,28	3.741,22	40,0%
3	7.497,28	2.853,44	38,1%
4	4.654,14	1.488,35	32,0%
5	10.952,77	3.161,11	28,9%
Totale	40.727,00	16.088,40	39,5%

Tabella 2: Tabella riassuntiva delle superfici censite in rapporto alla SUS dell'intero settore.

I dati raccolti nella stagione 2021 vengono raffrontati con la serie storica a partire dal 2016, in quanto nel 2020 non sono stati svolti censimenti esaustivi ma ricavate esclusivamente stime di popolazione.

SETTORE 1

Complessivamente nel settore 1 sono stati censiti 4.844,34 ha di Superficie Utile alla Specie (SUS), pari al 58,6 % della SUS dell'interno settore.

I censimenti si sono svolti nelle 4 macroaree nei giorni 10, 17 e 18 aprile 2021. Complessivamente sono stati osservati 230 caprioli, con un decremento di 87 capi rispetto alla stagione venatoria 2019 (ultimo dato di censimento), con indice di densità pari a 4,75 capi/100ha.

Di seguito si riporta la classificazione per età e classe di sesso.

	Classe I	Classe II	Indet	TOTALE
Maschi	27	70	2	99
Femmine	29	74	7	110
Indet	-	-	21	21
TOTALE	56	144	30	230

Tabella 3: Tabella riassuntiva per classe di età e sesso dei soggetti avvistati durante i censimenti nel Settore 1.




Grafico 1: Trend delle consistenze, piani di prelievo e percentuale di assegnazione negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 2

Complessivamente nel settore 2 sono stati censiti 3.741,22 ha di Superficie Utile alla Specie (SUS), pari al 40,0 % della SUS dell'interno settore.

I censimenti si sono svolti nelle 3 macroaree dal 10 aprile al 2 maggio 2021. Complessivamente sono stati osservati 120 caprioli, con un decremento di 67 unità rispetto alla stagione venatoria 2019 (ultimo dato di censimento), con indice di densità pari a 3,21 capi/100ha.

Di seguito si riporta la classificazione per età e classe di sesso

	Classe I	Classe II	Indet	TOTALE
Maschi	15	43	1	59
Femmine	19	35	2	56
Indet	-	-	5	5
TOTALE	34	78	8	120

Tabella 4: Tabella riassuntiva per classe di età e sesso dei soggetti avvistati durante i censimenti nel Settore 2.




Grafico 2: Trend delle consistenze, piani di prelievo e percentuale di assegnazione negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 3

Complessivamente nel settore 3 sono stati censiti 2.853,44 ha di Superficie Utile alla Specie (SUS), pari al 38,1 % della SUS dell'interno settore.

I censimenti si sono svolti nelle 3 macroaree nei giorni 10 e 17 aprile e 15 e 16 maggio 2021.

Complessivamente sono stati osservati 139 caprioli, con un decremento di 36 unità rispetto alla stagione venatoria 2019 (ultimo dato di censimento), con indice di densità pari a 4,87 capi/100ha.

Di seguito si riporta la classificazione per età e classe di sesso.

	Classe I	Classe II	Indet	TOTALE
Maschi	22	45	1	68
Femmine	20	44	1	65
Indet	-	-	6	6
TOTALE	42	89	8	139

Tabella 5: Tabella riassuntiva per classe di età e sesso dei soggetti avvistati durante i censimenti nel Settore 3.




Grafico 3: Trend delle consistenze, piani di prelievo e percentuale di assegnazione negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 4

Complessivamente nel settore 4 sono stati censiti 1.488,35 ha di Superficie Utile alla Specie (SUS), pari al 32,0 % della SUS dell'interno settore.

I censimenti si sono svolti nelle 4 macroaree nei giorni 10, 17 e 18 aprile e 8 e 9 maggio 2021.

Complessivamente sono stati osservati 121 caprioli, con un decremento di 52 unità rispetto alla stagione venatoria 2019 (ultimo dato di censimento), con indice di densità pari a 8,13 capi/100ha.

Di seguito si riporta la classificazione per età e classe di sesso.

	Classe I	Classe II	Indet	TOTALE
Maschi	18	28	0	46
Femmine	23	48	0	71
Indet	-	-	4	4
TOTALE	41	76	4	121

Tabella 6: Tabella riassuntiva per classe di età e sesso dei soggetti avvistati durante i censimenti nel Settore 4.




Grafico 4: Trend delle consistenze, piani di prelievo e percentuale di assegnazione negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 5

Complessivamente nel settore 5 sono stati censiti 3.161,11 ha di Superficie Utile alla Specie (SUS), pari al 28,9 % della SUS dell'interno settore.

I censimenti si sono svolti nelle 3 macroaree nei giorni 11, 18 e 25 aprile e 2 e 9 maggio 2021.

Complessivamente sono stati osservati 193 caprioli, con un decremento di 20 unità rispetto alla stagione venatoria 2019 (ultimo dato di censimento), con indice di densità pari a 6,11 capi/100ha.

Di seguito si riporta la classificazione per età e classe di sesso.

	Classe I	Classe II	Indet	TOTALE
Maschi	16	53	4	73
Femmine	42	65	1	108
Indet	-	-	12	12
TOTALE	58	118	17	193

Tabella 7: Tabella riassuntiva per classe di età e sesso dei soggetti avvistati durante i censimenti nel Settore 5.




Grafico 5: Trend delle consistenze, piani di prelievo e percentuale di assegnazione negli ultimi anni di gestione.

CONSUNTIVO COMPRESORIO VALLE BREMBANA

Complessivamente nel CA Valle Brembana sono stati censiti 16.088,40 ha di Superficie Utile alla Specie (SUS), pari al 39,5% della SUS dell'interno Comprensorio.

Complessivamente sono stati osservati 803 caprioli, con un decremento di 262 unità rispetto alla stagione venatoria 2019 (ultimo dato di censimento), con indice di densità pari a 4,99 capi/100ha.

Tale calo è purtroppo in linea con quanto si sta osservando sul capriolo sull'intero arco alpino a causa del cambiamento dell'uso del suolo e della vegetazione (*Alpine landscape and canopy cover from 1973 to 2011: are roe and red deer population dynamics linked?* Chirichella R, Mustoni A, Apollonio M. - Wildlife Research, 2017). Osservando i dati relativi agli incidenti stradali, in linea con gli anni precedenti, si osserva che il calo della popolazione è probabilmente inferiore rispetto ai dati di censimento che sono influenzati invece da una minor contattabilità della specie che tende a frequentare sempre con maggior frequenza areali vicino ai centri abitati e quindi al di fuori dei settori e delle parcelle di censimento.

Di seguito si riporta la classificazione per età e classe di sesso. Si sottolinea che tale metodica di censimento, unitamente alle condizioni meteo non sempre eccellenti dal punto di vista della visibilità, non permette sempre una chiara determinazione della classe dei soggetti avvistati, e quindi alcune classi, in particolare i soggetti di circa 10/11 mesi di età, potrebbero risultare sottostimati.

	Classe I	Classe II	Indet	TOTALE
Maschi	98	239	8	345
Femmine	133	266	11	510
Indet	-	-	48	48
TOTALE	231	505	67	803

Tabella 8: Tabella riassuntiva per classe di età e sesso dei soggetti avvistati durante i censimenti nel CA Valle Brembana.

Il numero di soggetti indeterminati sul totale è relativamente contenuto (5,9%) è ciò aiuta nell'individuazione corretta della struttura di popolazione per classi di età.

In base ai dati disponibili i parametri di popolazione stimati sono i seguenti:

Settore	Nr capi	Densità	Parametri di popolazione		
			ff/mm	Juv/F _{ad}	Juv/Ad
1	230	4,75	1,11	0,76	0,39
2	120	3,21	0,95	0,97	0,44
3	139	4,87	0,96	0,95	0,47
4	121	8,13	1,54	0,85	0,54
5	193	6,11	1,48	0,89	0,49
TOT	803	4,99	1,19	0,87	0,46

Tabella 9: Riepilogo dati relativi ai censimenti svolti nel periodo pre-riproduttivo alla specie capriolo secondo le indicazioni della scheda raccolta dati ISPRA.

Analizzando a livello gestionale e cartografico le metapopolazioni del capriolo presenti nel territorio del CA Valle Brembana, emerge un calo significativo che conferma il trend decrescente delle popolazioni di capriolo sull'intero arco alpino.




Grafico 6: Consistenza minima certa desunta dai censimenti a partire dal 2016, e consistenza totale registrata nel Comprensorio Alpino Valle Brembana (Linea rossa piena) e trend stimato della popolazione (Linea verde tratteggiata).

Il trend demografico della popolazione nell'intero Comprensorio dimostra un calo significativo. Tuttavia, questo calo appare riferibile non solo ad una tendenza della popolazione ma anche ad una maggior difficoltà di censimento alla specie che, entrando in conflitto con le popolazioni di cervo, in netta espansione demografica e spaziale sul territorio, costringe il capriolo ad abbassarsi di quota e frequentare maggiormente le aree limitrofe ai centri abitati, territori che non rientrano nelle parcelle di censimento. A conferma di ciò il costante quadro degli incidenti stradali rilevato sul territorio.

Per tali motivi, i piani di seguito proposti, seppur molto conservativi, devono essere interpretati anche nel gestire adeguatamente la specie limitando eventuali conflitti con le attività antropiche, tutelando il patrimonio faunistico nell'interesse dell'ambiente del Comprensorio.

ESITO DEL PIANO DI PRELIEVO 2020/2021

Il prelievo della stagione venatoria 2020/2021 è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti dal Calendario venatorio regionale seppur frenato dalle situazioni contingenti alla pandemia da Covid-19.

Infatti, sono stati prelevati complessivamente 68 caprioli su 118 assegnati, con un successo di realizzazione del piano pari al 57,6%, ripartito nelle diverse classi di età e sesso.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	13	18	30	61
Femmine	10	17	30	57
TOTALE	23	35	60	118

Tabella 10: Piano di prelievo nel CA Valle Brembana nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0	8	35	43
Femmine	4	12	9	25
TOTALE	4	20	44	68

Tabella 11: Capi prelevati nel CA Valle Brembana nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0%	44%	117%	70%
Femmine	40%	71%	30%	44%

Tabella 12: Successo del piano di prelievo nel CA Valle Brembana.

SETTORE 1

Nel settore 1, a fronte di 34 capi assegnati, sono stati prelevati 20 capi, pari al 58,8% del piano di prelievo.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	4	5	9	18
Femmine	3	5	8	16
TOTALE	7	10	17	34

Tabella 13: Piano di prelievo nel Settore 1 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0	2	10	12
Femmine	1	4	3	8
TOTALE	1	6	13	20

Tabella 14: Capi prelevati nel Settore 1 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0%	40%	111%	67%
Femmine	33%	80%	38%	50%

Tabella 15: Successo del piano di prelievo nel Settore 1.

SETTORE 2

Nel settore 2, a fronte di 20 capi assegnati, sono stati prelevati 13 capi, pari al 65,0% del piano di prelievo.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	2	3	5	10
Femmine	2	3	5	10
TOTALE	4	6	10	20

Tabella 16: Piano di prelievo nel Settore 2 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0	1	7	8
Femmine	1	3	1	5
TOTALE	1	4	8	13

Tabella 17: Capi prelevati nel Settore 2 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0%	33%	140%	80%
Femmine	50%	100%	20%	50%

Tabella 18: Successo del piano di prelievo nel Settore 2.

SETTORE 3

Nel settore 3, a fronte di 20 capi assegnati, sono stati prelevati 11 capi, pari al 55,0% del piano di prelievo.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	2	3	5	10
Femmine	2	3	5	10
TOTALE	4	6	10	20

Tabella 19: Piano di prelievo nel Settore 3 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0	2	6	8
Femmine	0	2	1	3
TOTALE	0	4	7	11

Tabella 20: Capi prelevati nel Settore 3 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0%	67%	120%	80%
Femmine	0%	67%	20%	30%

Tabella 21: Successo del piano di prelievo nel Settore 3.

SETTORE 4

Nel settore 4, a fronte di 16 capi assegnati, sono stati prelevati 9 capi, pari al 56,3% del piano di prelievo.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	2	3	4	9
Femmine	1	2	4	7
TOTALE	3	5	8	16

Tabella 22: Piano di prelievo nel Settore 4 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0	2	4	6
Femmine	1	2	0	3
TOTALE	1	4	4	9

Tabella 23: Capi prelevati nel Settore 4 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0%	67%	100%	67%
Femmine	100%	100%	0%	43%

Tabella 24: Successo del piano di prelievo nel Settore 4.

SETTORE 5

Nel settore 5, a fronte di 28 capi assegnati, sono stati prelevati 17 capi, pari al 60,7% del piano di prelievo.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	3	4	7	14
Femmine	2	4	8	14
TOTALE	5	8	15	28

Tabella 25: Piano di prelievo nel Settore 5 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0	1	8	9
Femmine	1	1	4	6
TOTALE	1	2	12	17

Tabella 26: Capi prelevati nel Settore 5 nella stagione 2020/21.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	0%	25%	114%	64%
Femmine	50%	25%	50%	43%

Tabella 27: Successo del piano di prelievo nel Settore 5.

PIANO DI PRELIEVO PER LA STAGIONE 2021/2022

La tipologia di censimento adottata, l'assenza di altre metodiche di stima della popolazione e di animali marcati, non permette di estrapolare i dati complessivi del capriolo nell'areale di gestione del CA Valle Brembana, per tale motivo il prelievo sarà calcolato sul numero degli animali censiti, corrispondenti alla consistenza minima certa, così come valutato anche negli anni scorsi.

Il comitato di gestione, su suggerimento del Tecnico incaricato, ha ritenuto legittimo richiedere un prelievo di tipo conservativo, così come previsto dal Protocollo tecnico di gestione della Provincia di Bergamo, considerando anche la tendenza negativa della popolazione registrata rispetto al 2019.

Considerando le densità ancora soddisfacenti della popolazione nei vari settori, si suggerisce un prelievo non superiore all'11% del censito.

Settore	Nr capi	Densità	% prelievo proposta	Proposta Piano prelievo
1	230	4,75	11 %	25
2	120	3,21	11 %	13
3	139	4,87	11 %	15
4	121	8,13	11 %	13
5	193	6,11	11 %	21

Tabella 28: Consistenza stimata su superficie boscata, densità pre-riproduttiva stimata e proposta di piano di prelievo per la stagione venatoria 2019/2020.

Si è ritenuto inoltre opportuno riequilibrare il prelievo tra le classi giovanili e femminili anche alla luce degli scompensi registrati la scorsa stagione venatoria, in cui il prelievo è risultato essere troppo sbilanciato nei confronti dei maschi. Si cercherà inoltre di porre dei correttivi nel regolamento per tutelare il più possibile le femmine allattanti.

SETTORE 1

In considerazione del decremento della popolazione e dell'eccessivo prelievo nella scorsa stagione venatoria di maschi di Classe II, si propone per la stagione 2021/2022 un piano di prelievo di 25 capi, pari al 10,9% della consistenza minima dei caprioli sul territorio del settore, di seguito ripartito tra le classi di età e sesso.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	3	4	5	12
Femmine	3	5	5	13
TOTALE	6	9	10	25

Tabella 29: Proposta piano di prelievo per la specie capriolo nel Settore 1.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	12%	16%	20%	48%
Femmine	12%	20%	20%	52%

Tabella 30: Ripartizione percentuale del piano di prelievo per classi di età e sesso nel Settore 1.




Grafico 7: Piani di prelievo, capi prelevati e percentuale di successo del piano negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 2

In considerazione del decremento della popolazione e dell'eccessivo prelievo nella scorsa stagione venatoria di maschi di Classe II, si propone per la stagione 2021/2022 un piano di prelievo di 13 capi, pari al 10,8% della consistenza minima dei caprioli sul territorio del settore, di seguito ripartito tra le classi di età e sesso.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	2	2	2	6
Femmine	2	2	3	7
TOTALE	4	4	5	13

Tabella 31: Proposta piano di prelievo per la specie capriolo nel Settore 2.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	15%	15%	15%	46%
Femmine	15%	15%	23%	54%

Tabella 32: Ripartizione percentuale del piano di prelievo per classi di età e sesso nel Settore 2.




Grafico 8: Piani di prelievo, capi prelevati e percentuale di successo del piano negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 3

In considerazione del decremento della popolazione e dell'eccessivo prelievo nella scorsa stagione venatoria di maschi di Classe II, si propone per la stagione 2021/2022 un piano di prelievo di 15 capi, pari al 10,8% della consistenza minima dei caprioli sul territorio del settore, di seguito ripartito tra le classi di età e sesso.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	2	2	3	7
Femmine	2	3	3	8
TOTALE	4	5	6	15

Tabella 33: Proposta piano di prelievo per la specie capriolo nel Settore 3.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	13%	13%	20%	47%
Femmine	13%	20%	20%	53%

Tabella 34: Ripartizione percentuale del piano di prelievo per classi di età e sesso nel Settore 3.




Grafico 9: Piani di prelievo, capi prelevati e percentuale di successo del piano negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 4

In considerazione del decremento della popolazione e dell'assenza di prelievi nella classe II delle femmine, si propone per la stagione 2021/2022 un piano di prelievo di 13 capi, pari al 10,7% della consistenza minima dei caprioli sul territorio del settore, di seguito ripartito tra le classi di età e sesso.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	2	2	2	6
Femmine	2	2	3	7
TOTALE	4	4	5	13

Tabella 35: Proposta piano di prelievo per la specie capriolo nel Settore 4.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	15%	15%	15%	46%
Femmine	15%	15%	23%	54%

Tabella 36: Ripartizione percentuale del piano di prelievo per classi di età e sesso nel Settore 4.




Grafico 10: Piani di prelievo, capi prelevati e percentuale di successo del piano negli ultimi anni di gestione.

SETTORE 5

In considerazione del leggero decremento della popolazione e dello squilibrio nel prelievo delle classi assegnate, si propone per la stagione 2021/2022 un piano di prelievo di 21 capi, pari al 10,9% della consistenza minima dei caprioli sul territorio del settore, di seguito ripartito tra le classi di età e sesso.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	3	3	4	10
Femmine	3	4	4	11
TOTALE	6	7	8	21

Tabella 37: Proposta piano di prelievo per la specie capriolo nel Settore 5.

	Cl. 0	Cl. I	Cl. II	TOT
Maschi	14%	14%	19%	48%
Femmine	14%	19%	19%	52%

Tabella 38: Ripartizione percentuale del piano di prelievo per classi di età e sesso nel Settore 5.




Grafico 11: Piani di prelievo, capi prelevati e percentuale di successo del piano negli ultimi anni di gestione.